

医師記入

登園許可証

社会福祉法人豊仁会  
花小金井にこにこ保育園園長殿

園児名

病名「

」

年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断します。

年 月 日

医療機関

医師名

印又はサイン

保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるように、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育園生活が可能な状態となつてからの登園であるようご配慮ください。

○医師が記入した許可証が望ましい感染症

| 感染症名            |                              | 感染しやすい期間                             | 登園の目安                                                      |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 麻疹（はしか）         |                              | 発症1日前から発疹出現後の4日後まで                   | 解熱後3日を経過してから                                               |
| インフルエンザ（A・B）    |                              | 症状がある期間（発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い） | 発症した後5日経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで                                |
| 風疹              |                              | 発疹出現の前7日間から後7日間                      | 発疹が消失するまで                                                  |
| 水痘（みずぼうそう）      |                              | 発疹出現1～2日前から痂痂形成まで                    | すべての発疹が痂痂（かさぶた）となるまで                                       |
| 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） |                              | 発症3日前から耳下腺腫脹後4日                      | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで              |
| 結核              |                              |                                      | 医師により感染の恐れがないと認めるまで                                        |
| アデノウイルス感染症      | 咽頭結膜熱（プール熱）                  | 発熱、充血等症状が出現した数日間                     | 主症な症状が消失してから2日を経過するまで                                      |
|                 | 流行性角結膜炎（はやり目）                | 充血、目やに等症状が出現した数日間                    | 感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから                                   |
|                 | 百日咳                          | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで           | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な治療を終了するまで                             |
|                 | 腸管性出血性大腸菌感染症（O157・O26・O111等） |                                      | 症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの |
|                 | 急性出血性結膜炎                     | ウイルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数ヶ月排出される      | 医師により感染の恐れがないと認めるまで                                        |